

ORIGINAL ARTICLE

Mitochondria as a Possible Place for Initial Stages of Steroid Biosynthesis in Plants

Elena K. Shematorova¹, Ivan Yu. Slovokhotov¹, Marat R. Khaliluev^{2,3},
Irina N. Berdichevets^{4,5}, Ekaterina N. Baranova³, Olga G. Babak⁴,
Dmitry G. Shpakovski¹, Svetlana G. Spivak^{4,6}, George V. Shpakovski^{1*}

¹ Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow 117997, Russia

² Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow 127550, Russia

³ All-Russia Research Institute of Agricultural Biotechnology, Russian Academy of Agricultural Sciences, Moscow 127550, Russia

⁴ Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk 220072, Belarus

⁵ K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences, Moscow 127276, Russia

⁶ Belarussian State Medical University, Minsk 220116, Belarus

*E-Mail: gvs@ibch.ru

Received November 7, 2014

With the aim of thorough comparison of steroidogenic systems of plants and animals, transgenic plants of Solanaceae family expressing *CYP11A1* cDNA encoding cytochrome P450_{scc} of mammalian mitochondria were further analysed. Positive effect of *CYP11A1* on resistance of the transgenic tobacco plants to the infection by fungal phytopathogene *Botrytis cinerea* was for the first time detected. Subtle changes in mitochondria of the transgenic *Nicotiana tabacum* plants expressing mammalian *CYP11A1* cDNA were demonstrated by transmissive electron microscopy. Genetic determinants (cDNAs and genes) encoding main components of the electron transfer chain of plant mitochondria were for the first time cloned and characterized. It was established that plants from the Solanaceae family (tomato, tobacco and potato) contain two different genes with similar exon-intron structures (all contain 8 exons) encoding mitochondrial type ferredoxins (MFDX), and one gene for mitochondrial ferredoxin reductase (MFDXR). The results obtained point out on profound relatedness of electron transfer chains of P450-dependent monooxygenases in mammalian and plant mitochondria and support our previous findings about functional compatability of steroidogenic systems of Plantae and Animalia.

Key words: transgenic plants, *Nicotiana tabacum* L., *Solanum lycopersicum* L., *Digitalis purpurea* L., *CYP11A1*, cytochrome P450_{scc}, *Botrytis cinerea*, mitochondrial type plant ferredoxins (MFDX), progesterone, electron microscopy.

ORIGINAL ARTICLE

Митохондрии как возможное место инициации синтеза стероидных гормонов в растениях

Е.К. Шематорова¹, И.Ю. Словохотов¹, М.Р. Халилуев^{2,3},
И.Н. Бердичевец^{4,5}, Е.Н. Баранова³, О.Г. Бабак⁴,
Д.Г. Шпаковский¹, С.Г. Спивак^{4,6}, Г.В. Шпаковский^{1*}

¹ ФГБУН Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва 117997, Россия

² ФГБОУ ВПО Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва 127550, Россия

³ ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН, Москва 127550, Россия

⁴ ГНУ Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск 220072, Беларусь

⁵ ФГБУН Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН, Москва 127276, Россия

⁶ Белорусский государственный медицинский университет, Минск 220116, Беларусь

*E-Mail: gys@ibch.ru

Поступила в редакцию 7 Ноября 2014 г.

С целью сравнения стероидогенных систем растений и животных продолжен анализ трансгенных растений семейства Solanaceae, экспрессирующих кДНК гена *CYP11A1*, кодирующего у животных митохондриальный цитохром P450_{scc}. Показано положительное влияние *CYP11A1* на устойчивость трансгенных растений табака к грибному фитопатогену *Botrytis cinerea*. Установлено резкое изменение структуры митохондрий трансгенных растений табака, что является первым свидетельством в пользу гипотезы о том, что начальные стадии синтеза стероидных гормонов могут происходить в растительных митохондриях. Впервые структурно охарактеризованы основные компоненты митохондриальной электротранспортной цепи растений: клонированы и установлена структура кДНК и генов аденодоксиноподобных ферредоксинов табака, томата и картофеля семейства Solanaceae. Установлено, что у растений этого семейства имеются два разных гена ферредоксинов митохондриального типа (*MFDX1* и *MFDX2*), имеющие сходную экзон-интронную структуру и кодирующие предшественники аденодоксиноподобных белков, различающиеся прежде всего по структуре N-концевого участка белка (кодируется первым и вторым экзонами), соответствующего лидерному пептиду. Полученные результаты указывают на несомненное сходство электротранспортных цепей P450-зависимых монооксигеназ в митохондриях животных и растений и ещё раз свидетельствуют о возможности совмещения стероидогенных систем Plantae и Animalia.

Key words: трансгенные растения, *Nicotiana tabacum* L., *Solanum lycopersicum* L., *Digitalis purpurea* L., *CYP11A1*, цитохром P450_{scc}, *Botrytis cinerea*, растительные ферредоксины митохондриального типа (*MFDX*), прогестерон, электронная микроскопия.

В последнее десятилетие получен ряд экспериментальных данных об определённой структурной и функциональной консервативности путей биосинтеза биологически активных стероидных соединений в растениях и у животных. Установлено, что основные стадии в процессах биосинтеза и метаболизма стероидных гормонов животных и brassinosterоидов растений катализируют цитохромы P450, в обеих системах функционируют такие ферменты, как стероид-5 α -редуктаза (5 α R) и 3 β -гидроксистероид-дегидрогеназа / Δ^5 - Δ^4 -изомераза (3 β -HSD). Также убедительно доказано, что в растениях наряду с brassinosterоидами присутствуют такие стероидные гормоны животных, как прогестерон, 17-гидроксипрогестерон, 16-дегидроксипрогестерон и андростендион (Simerský et al., 2009; Pauli et al., 2010). Пути биосинтеза этих соединений и их роль в жизнедеятельности растений пока не изучены. На сегодняшний день установленным является лишь то, что прогестерон выполняет важные функции в регуляции процессов роста и развития растений: например, экзогенный прогестерон стимулирует рост и созревание пыльцы растений табака (Ylstra et al., 1995). Совокупность этих данных делает актуальным создание и исследование трансгенных растений, экспрессирующих гены стероидогенных белков животных. С одной стороны эти растения являются удобной моделью для изучения процессов биосинтеза и функций стероидных гормонов животных в растениях. С другой стороны подход,

основанный на применении генов белков стероидогенеза животных, может привести к созданию трансгенных растений, обладающих важными для сельского хозяйства свойствами, а в случае лекарственных растений – свойствами, важными для производства медицинских препаратов из растительного сырья. Не исключено также и то, что культура тканей этих трансгенных растений может найти биотехнологическое применение для осуществления трансформации различных стероидных соединений или их наработки.

Ключевую роль в биосинтезе стероидных гормонов животных играет цитохром P450_{SCC} (side-chain-cleaving), который локализован во внутренней мембране митохондрий клеток стероидогенных тканей и, с участием двух других компонентов митохондриальной электрон-транспортной цепи, аденодоксина и аденодоксинредуктазы, катализирует реакцию отщепления боковой цепи холестерина с превращением его в прегненолон – общий предшественник всех стероидных гормонов животных. Несмотря на то, что похожий белок в растениях пока не найден, известно, что в растениях рода наперстянка (*Digitalis sp.*), по-видимому, также именно в митохондриях, происходит превращение холестерина в прегненолон (Lindemann & Luckner, 1997).

MATERIALS AND METHODS

Методы получения трансгенных растений с помощью агробактериальной трансформации,

использованные нами в данной работе, были подробно описаны в предыдущих публикациях (Kartel *et al.*, 2004; Spivak *et al.*, 2009; Khaliluev *et al.*, 2011).

Тестирование трансгенных растений табака, содержащих кДНК гена *CYP11A1*, на устойчивость к грибному фитопатогену *Botrytis cinerea*

проводили по методике, вкратце описанной нами ранее (Kartel *et al.*, 2004). В качестве тест-культуры использовали фитопатогенный гриб вида *Botrytis cinerea*, вызывающий серую гниль. В провоцирующих условиях изолированные листья среднего возраста и одного размера помещали в чашки Петри на фильтровальную бумагу, увлажненную водой. По 10 мкл суспензии спор возбудителя, содержащей 2000 спор/мл, наносили в 6 точек на лист, после чего чашки с листьями герметично закрывали для создания повышенной влажности и выдерживали в климатоканере при температуре 24 °C и 16-ти часовом световом дне. В качестве контроля использовали листья нетрансформированных растений и растений, содержащих только векторную плазмиду (без кДНК *CYP11A1*). Степень поражения листовых пластинок (обратная величина по отношению к устойчивости растения к *Botrytis cinerea*) оценивалась в баллах по количеству и размеру некротических пятен на 10-ые сутки после заражения.

Клонирование кДНК и генов митохондриальных ферредоксинов растений семейства *Solanaceae*

Для выделения тотальной геномной ДНК из листьев томата, картофеля и наперстянки

использовали методику, описанную нами ранее для табака (Kartel *et al.*, 2004), и представляющую собой модифицированную методику Эдвардса с соавторами (Edwards *et al.*, 1991), включающую дополнительную экстракцию фенолом.

Суммарную РНК экстрагировали из замороженных и гомогенизированных в жидком азоте листьев растений с помощью TRIzol-метода (Invitrogen) и очищали с использованием набора Qiagen RNeasy MinElute Cleanup kit (Qiagen). Синтез полноразмерных кДНК проводили по методу SMART (Zhu *et al.*, 2001), используя систему гнездовых SMART-праймеров с различающимися Sfil-сайтами (на 5'- и 3'-концах кДНК) и Long-Distance ПЦР-амплификацию для синтеза второй цепи и получения двухцепочечной кДНК (Barnes, 1994).

Для биоинформационного поиска последовательностей, предположительно кодирующих близкие по структуре к аденодоксину (ADX) и аденодоксинредуктазе (ADXR) белки из растений семейств *Solanaceae* (паслёновые) и *Scrophulariaceae* (норичниковые), использовали подходы, описанные в монографии по биоинформатике растений из серии *Methods in Molecular Biology* (Edwards D., Editor, 2007). На основании этих данных были сконструированы наборы маловырожденных праймеров и олигонуклеотидных зондов для поиска интересующих нас последовательностей в описанных выше препаратах геномной и комплементарной ДНК. В частности, для клонирования кДНК томата, картофеля и табака,

кодирующих ферредоксины митохондриального типа (MFDX) использовали праймеры oYSH16 (5'-GACGAATTCCAAATGGTSGGNTTYCA) и oYSH17 (5'-CAGGATCCCTCGAGCTARTGHGGYTTNGG).

Молекулярное клонирование полученных ПЦР-фрагментов, отбор и анализ клонов проводили с помощью методов последовательных разведений и/или гибридизации нуклеиновых кислот, описанных нами ранее (Shpakovski & Lebedenko, 1997; Shpakovski & Shematorova, 1999). ДНК секвенировали по методу Сэнгера на приборе ABI 3730 фирмы Applied Biosystems (Евроген, ИБХ РАН).

Трансмиссионная электронная микроскопия.

Растительным материалом для исследований служили асептические проростки *Nicotiana tabacum* cv. Petit Havana линии SR1 и полученные на основе этого сорта табака две трансгенные линии (TR-2, TR-7) поколения T₄, экспрессирующие кДНК гена *CYP11A1* цитохрома P450_{SCC}, выделенную из коры надпочечников быка. Фрагменты срединной части семядолей, полученных от двухнедельных асептических проростков, фиксировали при температуре +4 °С в 2,5% растворе глutarового альдегида на 0.1 М фосфатном буфере (pH 7.2) с добавлением 1.5% сахарозы. После отмывки от фиксирующей смеси растительный материал дофиксируют 1.0% раствором четырёхокси осмия (OsO₄) (Sigma, США), обезвоживали в этаноле повышающейся концентрации (30, 50, 70, 96 и 100%), затем – в окиси пропилена. Образцы заключали в смесь эпоксидных смол Эпона-812 и Аралдита по

стандартной методике. Ультратонкие срезы толщиной 30–40 нм получали на ультрамикротоме LKB-V, монтировали на покрытые формваровой подложкой бленды, после чего контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольдсу (Reynolds, 1963). Полученные препараты просматривали на электронном микроскопе H-500 (Hitachi, Япония) при ускоряющем напряжении 75 кВ.

RESULTS AND DISCUSSION

Ранее нами в рамках совместного проекта учёных России и Беларуси были получены и детально охарактеризованы трансгенные растения табака *Nicotiana tabacum* L. (в качестве удобного модельного объекта), экспрессирующие кДНК *CYP11A1* цитохрома P450_{SCC} из коры надпочечников быка (рис. 1) и обладающие повышенной продуктивностью и устойчивостью к грибным фитопатогенам (Shpakovski et al., 1992; Kartel et al., 2004; Kartel et al., 2007). Изучение четырёх поколений этих трансгенных растений показало, что они по сравнению с растениями дикого типа имеют сокращенный период вегетативного развития, выражающийся прежде всего в раннем цветении и созревании семян (рис. 2), увеличенную биомассу и повышенную продуктивность (количество и качество семян), а также повышенный иммунитет к неспецифическому патогену Паслёновых *Botrytis cinerea* (рис. 3). В отличие от контрольных растений дикого типа в трансгенных растениях обнаружен прегненолон – продукт реакции, катализируемой цитохромом P450_{SCC} (CYP11A1).

Установлено, что содержание прогестерона в листьях трансгенных растений существенно (в несколько раз) выше, чем в листьях растений дикого типа (Spivak *et al.*, 2009; Spivak *et al.*, 2010).

Очень важным было определить точное место синтеза прегненолона и прогестерона в полученных нами трансгенных растениях табака. У животных первые этапы синтеза стероидных гормонов (отщепление боковой цепи холестерина с превращением его в прегормон прегненолон, и далее – в прогестерон) происходят в митохондриях, на их внутренней мембране (Miller, 2013). Как отмечалось выше, именно там локализован цитохром P450_{SCC} (CYP11A1) и именно туда доставляется субстрат холестерин. При этом именно перемещение холестерина с наружной на внутреннюю мембрану митохондрий, осуществляемое с помощью особой, многокомпонентной макромолекулярной машины при активном участии белка StAR (*steroidogenic acute regulatory protein*), является скоростью-лимитирующей стадией в синтезе стероидных гормонов у животных.

В то же время, по всем имеющимся на сегодняшний день данным синтез brassinosteroidов (стероидных гормонов растений) происходит на мембранах эндоплазматического ретикулаума или, гораздо реже, на плазматической мембране растительных клеток. Несмотря на то, что цитохромы P450 представляют собой едва ли не самое обширное из всех белковых семейств в протеомах растений

(например, на них приходится ~1% кодирующего потенциала арабидопсиса (Nelson *et al.*, 2004)), существование митохондриальных цитохромов у растений до сих пор не доказано. Тем не менее, основываясь на данных Лузикова с соавторами (Luzikov *et al.*, 1994) о том, что незрелый цитохром P450_{SCC} из коры надпочечников быка импортируется в митохондрии растений, где приобретает размеры зрелой формы, аналогично тому, как это происходит в митохондриях клеток животных, при конструировании экспрессионного растительного вектора мы использовали полноразмерную последовательность кДНК CYP11A1 длиной в 1754 п.о. (рис. 1), кодирующую белок-предшественник P450_{SCC} из коры надпочечников быка с лидерным N-концевым экстрапептидом (Shpakovski *et al.*, 1992; Spivak *et al.*, 2009).

Поскольку уникальный только для животных ключевой фермент стероидогенеза CYP11A1 функционирует в митохондриях вместе с FAD-содержащим флавопротеидом ADXR (аденодоксинредуктазой) и [2Fe-2S]-ферредоксином ADX (аденодоксином), мы изучили, какие белки выполняют функцию этих партнёров цитохрома P450_{SCC} в растениях. В результате, впервые охарактеризованы основные компоненты митохондриальной электронтранспортной цепи растений: клонированы и установлена структура кДНК и генов аденодоксиноподобных ферредоксинов табака, томата, картофеля из семейства Solanaceae и наперстянки *Digitalis purpurea* L.

(семейство Scrophulariaceae). Установлено, что у растений из семейства паслёновых имеются два разных гена ферредоксинов митохондриального типа (*MFDX1* и *MFDX2*), имеющие сходную экзон-интронную структуру (содержат по 8 экзонов) и кодирующие предшественники адренодоксина-подобных белков (204-216 aa), различающиеся прежде всего по структуре *N*-концевого участка белка (кодируется первым и вторым экзонами), соответствующего лидерному пептиду (рис. 4). Определена первичная структура кДНК и генов, кодирующих белки NADPH-оксидоредуктазы (*MFDXR*) *Nicotiana tabacum* L., *Solanum lycopersicum* L. и *Solanum tuberosum* L. (485 aa), структурно родственные *ADXR* животных. Полученные результаты указывают на несомненное сходство электронтранспортных цепей P450-зависимых монооксигеназ в митохондриях животных и растений.

Далее, с помощью электронной микроскопии на ультратонких срезах листьев табака мы показали, что в изучаемых нами трансгенных растениях табака, экспрессирующих кДНК гена *CYP11A1*, изменяется структурная организация митохондрий: они уменьшаются в размерах, теряют характерную округлую форму (становятся более овальными) и приобретают более плотную, гранулированную консистенцию (рис. 5). Это указывает на то, что перенесённый нами в растения цитохром P450_{SCC} животных, по-видимому, также функционирует

именно в митохондриях (накапливаясь в митохондриях растений и даже изменяя их структуру). Эти данные – первое свидетельство того, что начальные этапы синтеза стероидных гормонов могут происходить и в растительных митохондриях. Будет интересно определить все белки-участники этого процесса, в частности истинные партнёры цитохрома P450_{SCC} в клетках растений.

Показанная нами на примере *CYP11A1* функциональная совместимость стероидогенных систем *Plantae* и *Animalia*, открыла перспективу получать трансгенные растения с комбинированными стероидогенными системами таких интересных с точки зрения сельского хозяйства, практической биотехнологии и/или фармакологии видов, как томат, картофель и наперстянка. Первичные трансгенные растения томата *Solanum lycopersicum* L. и наперстянки *Digitalis purpurea* L., экспрессирующие кДНК *CYP11A1* цитохрома P450_{SCC} из коры надпочечников животных, уже получены нами методом агробактериальной трансформации (рис. 6). В настоящее время полученные независимые трансгенные линии растений томата и наперстянки успешно адаптированы к почвенным условиям и выращены в защищенном грунте; для некоторых первичных трансгенных линий томата получены плоды с жизнеспособными семенами (рис. 7).

```

1      cagct  gtggggggcag  cATGCTAGCA  AGGGGGCTTC  CCCTCCGCTC  AGCCCTGGTC
56  AAAGCCTGCC  CACCCATCCT  GAGCTCAGTG  GGGGAGGGCT  GGGGCCACCA  CAGGGTGGGC
116 ACTGGAGAGG  GAGCTGGCAT  CTCCACAAAG  ACCCCTCGCC  CCTACAGTGA  GATCCCCCTC
176 CCTGGTGACA  ATGGCTGGCT  TAACCTCTAC  CATTTCTGGA  GGGAGAAGGG  CTCACAGAGA
236 ATCCACTTTC  GCCACATCGA  GAACTTCCAG  AAGTATGGCC  CCATTTACAG  GGAGAAAGCTT
296 GGCAATTGG  AGTCAGTTTA  TATCATTAC  CCTGAAGACG  TGGCCCATCT  CTCAAGTTC
356 GAGGGATCCT  ACCCAGAGAG  ATATGACATC  CCGCCCTGGC  TGGCCTATCA  CCGATATTAT
416 CAGAAACCCA  TTGGAGTCCT  GTTTAAGAAG  TCAGGAACCT  GGAAGAAAGA  CCGGGTGGTC
476 CTGAACACGG  AGGTGATGGC  TCCAGAGGCA  ATAAAGAAGT  TCATCCCACT  GCTGAATCCA
536 GTGTCACAG  ACTTCGTCAG  CCTCTGCAC  AAGCGCATCA  AGCAGCAGGG  CTCCGAAAG
596 TTTGTAGGG  ACATCAAGGA  AGACCTGTTT  CACTTTGCCT  TTGAGTCCAT  CACCAATGTC
656 ATGTTTGGG  AGCGCCTGGG  GATGCTGGAG  GAGACAGTGA  ACCCCGAGGC  CCAGAAAGTTC
716 ATTGATGCC  TCTACAAGAT  GTTCCACACC  AGTGTCCCTC  TGCTCAACGT  CCCTCCAGAA
776 CTGTACCGTC  TATTCAAGAA  CAAGACTTGG  AGGGACCATG  TAGCCGCATG  GGACACAATT
836 TTCAATAAAG  CTGAAAAATA  CACTGAGATC  TTCTACCAGG  ACCTGAGACG  GAAAACAGAA
896 TTTAGGAATT  ACCCAGGCAT  CCTCTACTGC  CTCCTGAAAA  GTGAGAAGAT  GCTCTTGGAG
956 GATGTCAAG  CCAATATTAC  GGAGATGCTG  GCAGGGGGTG  TGAACACGAC  ATCCATGACA
1016 TTGCAATGGC  ACTTGTACGA  GATGGCAGCG  AGCCTGAATG  TGCAGGAGAT  GCTGCGGGAG
1076 GAGGTTCTGA  ATGCCCGACG  CCAGGCAGAG  GGAGACATAA  GCAAGATGCT  GCAAATGGTC
1136 CCACTTCTCA  AAGCTAGCAT  CAAGGAGACG  CTGAGACTCC  ACCCCATCTC  CGTGACCCTG
1196 CAGAGATACC  CTGAAAGTGA  CTTGGTTCTT  CAAGATTACC  TGATTCTTGC  CAAGACACTG
1256 GTGCAAGTGG  CCATCTATGC  CATGGGCCGA  GACCCTGCCT  TCTTCTCCAG  TCCGGACAAG
1316 TTTGACCCAA  CCAGGTGGCT  GAGTAAAGAC  AAAGACCTCA  TCCACTTCCG  GAACCTGGGC
1376 TTTGGCTGGG  GAGTGC GGCA  GTGCGTGGG  CGGCGGATCG  CCGAGCTGGA  GATGACCCTC
1436 TTCCTCATCC  ACATTCTGGA  GAACTTCAAG  GTTGAAATGC  AGCATATCG  TGACGTGGAC
1496 ACCATATTCA  ACCTCATCCT  GACGCCGAC  AAGCCCATCT  TCCTTGTCTT  CCGCCCTTC
1556 AACCAGGACC  CGCCCCAGGC  GTGAcgggag  agggcgggca  ctgccctttc  caccaatcca
1616 gctagctggg  gtgtgggaag  acggcccgag  ggggtggggc  catggaggta  cccgcacctc
1676 cattgctcgc  tcagtccaca  cctcttgac  ctttctggct  aggtctgacc  agatgaagct
1736 ggcactcag  ggtcagctg

```

Рисунок 1. Нуклеотидная последовательность полноразмерной кДНК гена *CYP11A1* из коры надпочечников быка, использованная нами при создании рекомбинантных плазмид для её экспрессии в растениях. Подчёркнуты стартовый (ATG) и терминирующий (TGA) кодоны и выделенный помимо этого ещё и жирным шрифтом кодон ATC, кодирующий первую аминокислоту (Ile) зрелого белка – цитохрома P450_{SCC}.




Рисунок 2. Динамика образования семенных коробочек у трансгенных растений табака поколения Т3. CYPL1–CYPL4 – независимые линии трансгенных растений табака, экспрессирующих кДНК *CYP11A1*; K1 – контрольные растения дикого типа, pG1 – растения, трансформированные вектором, не содержащим кДНК *CYP11A1*.




Рисунок 3. Результаты биотеста на устойчивость трансгенных растений табака, экспрессирующих кДНК гена *CYP11A1*, к грибному фитопатогену *Botrytis cinerea* (а – поражение листа). 1 – контрольное нетрансгенное растение (поражение листа в 7 баллов); 2 – растение одной из трансгенных линий (поражение листа в 1 балл).

S1-MFDX1 :

MVG FHVRLAHRLTRSSISALLLHDSASAAHVSLKVGSRSYNTAAKNRIRDLFPSNCSNATSP
CNP GTSYGPLSRYQILLGLGHKEYCTTTGNEEKQTISVTFVDKDGEKHIKVPVGMSLLEAAHE
NDIELEGACEGSLACSTCHVIVMDVDQYNKLEDPTDEENDMLDLAFGLTETSRLGCQVIAPKEL
DGIRVALPAATRNFVAVDGYKPKPH (216 aa)

S1-MFDX2 :

MVG FQNLRLAHRLTGYVSRSTCELLLKIGCRGYCTEISNRVRNLFPLNYISAPLACIPRTSYTD
LLRYSSTQGLRHEQFCTTAGNEEMQKISVTFVDKDGEENHIKVPVGMSMLEAAHENDIELEGAC
EASLACSTCHVIVMDMEYYNKLEDPTDEENDMLDLAFALTDTSRLGCQVIAPKELDGIRLALPV
ATRNFVAVDGYKPKPH (207 aa)

Nt-MFDX1 :

MVG FHVLRRAARRLARCSSLSSLLRGSPSAFGSFLKVGCRSYNTSTRNRAGVLFPSNSLNALSAC
TSETSHYPLSRYHFLQRHEQYCTAAGNEEKQTISVTFVDKDGEKHIKVPVGMSMLEAAHENDI
ELEGACEGSLACSTCHVIVMDVDYYNKLEDPTDEENDMLDLAFGLTETSRLGCQVIAPKELDGL
RLALPAATRNFVAVDGYEPPKH (213 aa)

Nt-MFDX2 :

MVG FHVIRIARRFARCSAFGSFLKVGCRSYNTATRNAGVLFPSNSLNALLACTSGTSHDPLSR
CHFSRVLRHEQYCTTAGNEEKQTISVTFVDKDGEKHIKVPVGMSMLEAAHENDIELEGACEGS
LACSTCHVIVMDVDYYNKLEDPTDEENDMLDLAFGLTETSRLGCQVIAPKELDGLRLALPAATR
NFVAVDGYKPKPH (204 aa)

St-MFDX1 :

MVG FHVRLAHSLTRSSLSSLLHDSASAAHVSLKVGSRSYNTAAKNRIRGLFPSNCSNAISP
CTPGTSYGPLSRYQILLGLRHKEYCTTTGSEKQTISVTFVDKDGEKHIKVPVGMSLLEAAHE
NDIELEGACEGSLACSTCHVIVMDVDQYNKLEDPTDEENDMLDLAFGLTETSRLGCQVIAPKEL
DGIRVALPAATRNFVAVDGYKPKPH (216 aa)

St-MFDX2 :

MVG FHNRLAHRLTGCSLSSLLHGSASTCELSLKVGCRSYCTGTSNRVRNLFPLNYISAPLAC
IPRTSYTHLLRYSSTQGLRHEQFCTTAGNEGEQKISVTFVDKDGEENHIKVPVGMSMLEAAHEN
DIELEGACEASLACSTCHLIVMDMEYYNKLEDPTDEENDMLDLAFALTDTSRLGCQVIAPKEL
GIRLALPVATRNFVAVDGYKPKPH (215 aa)

Рисунок 4. Аминокислотные последовательности митохондриальных ферредоксинов (MFDX) томата (Sl), картофеля (St) и табака (Nt), выведенные нами из установленных первичных структур впервые клонированных и секвенированных полноразмерных кДНК соответствующих генов. Sl – *Solanum lycopersicum*, Nt – *Nicotiana tabacum*, St – *Solanum tuberosum*.




Рисунок 5. Ультраструктурная организация фрагментов клеток губчатой (А, В, Д) и столбчатой (Б, Г, Е) паренхимы семядольного листа растений дикого типа (А, Б) и трансгенных линий табака TR-2 (В, Г) и TR-7 (Д, Е), экспрессирующих кДНК *CYP11A1* цитохрома P450_{SCC} из коры надпочечников быка. Обозначения: М – митохондрия, Хл – хлоропласт, В – вакуоль, Я – ядро. Масштабная линейка – 0,5 мкм.




Рисунок 6. Регенерация растений наперстянки *Digitalis purpurea* L. на среде, содержащей селективный агент – канамицин. А – экспланты листьев растений исходного (дикого) типа. Б – экспланты листьев растений, подвергнутых агробактериальной генетической трансформации.



Рисунок 7. Плоды со зрелыми семенами первичных трансгенных растений томата *Solanum lycopersicum* L. (сорт Рекордсмен), экспрессирующих кДНК гена *CYP11A1* из коры надпочечников быка (линия 7, растение 2 [трансгенная линия 7-2]).

ACKNOWLEDGMENT

Данная работа осуществлялась в рамках совместного российско-белорусского исследовательского проекта при финансовой поддержке Российского (РФФИ) и Белорусского республиканского (БРФФИ) фондов фундаментальных исследований.

REFERENCES

- Barnes W.M. (1994) PCR amplification of up to 35-kb DNA with high fidelity and high yield from lambda bacteriophage templates. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **91**, 2216–2220.
- Edwards D., Editor (2007) *Plant Bioinformatics (Methods and Protocols)* [From: *Methods in Molecular Biology* (J.M. Walker, Series Editor)] – Totowa, New Jersey.: Humana Press, 552 pp.
- Edwards K., Johnstone C., Thompson C. (1991) A simple and rapid method for the preparation of plant genomic DNA for PCR analysis. *Nucleic Acids Research*, **19**, 1349.
- Kartel N.A., Shpakovski G.V., Spivak S.G., Brichkova G.G., Yarmolinsky D.G., Berdichevets I.N., Maneshina N.V. (2004) Recombinant plasmid pGBP450f for construction of transgenic plants and the approach for generation of transgenic

- tobacco plants with higher productivity and resistance to fungal phytopathogens: Patent of the Russian Federation No. 2237717. Bulletin of Innovations 2004. No. 10. (Application No. 2002134424. Priority from December 20, 2002. Registered October 10, 2004).
- Kartel N.A., Spivak S.G., Shpakovski G.V., Maneshina N.V., Brichkova G.G., Yarmolinsky D.G., Berdichevets I.N. (2007) Gene engineering construct expressing cDNA of the mammalian *CYP11A1* gene in plants and the approach for generation of transgenic plants with higher productivity and resistance to phytopathogens: Patent of the Republic of Belarus No. 9201. (Application No. a20021122. Priority from December 30, 2002. Registered January 25, 2007).
- Khaliluev M.R., Mamonov A.G., Smirnov A.N., Kharchenko P.N., Dolgov S.V. (2011) Expression of genes encoding chitin-binding proteins (PR-4) and hevein-like antimicrobial peptides in transgenic tomato plants enhanced resistance to *Phytophthora infestans*. *Russ. Agricult. Sci.*, **4**, 297-302.
- Lindemann P., Luckner M. (1997) Biosynthesis of pregnane derivatives in somatic embryos of *Digitalis lanata*. *Phytochemistry*, **46**, 507–513.
- Luzikov V.N., Novikova L.A., Spiridonova V.A., Isaeva L.V., Whelan J., Hugosson M., Glazer E. (1994) Design of heterologous mitochondria: import of cattle cytochrome P-450_{scc} precursors in plant mitochondria. *Biochemistry (Moscow)* [Biokhimiia], **59**, 1098–1101.
- Miller W.L. (2013) Steroid hormone synthesis in mitochondria. *Molecular and Cellular Endocrinology*, **379**, 62–73.
- Nelson D.R., Schuler M.A., Paquette S.M., Werck-Reichhart D., Bak S. (2004) Comparative genomics of rice and arabidopsis. Analysis of 727 cytochrome P450 genes and pseudogenes from a monocot and a dicot. *Plant Physiology*, **135**, 756–772.
- Pauli G.F., Friesen J.B., Gödecke T., Farnsworth N.R., Glodny B. (2010) Occurrence of progesterone and related animal steroids in two higher plants. *Journal of Natural Products*, **73**, 338–345.
- Reynolds E.S. (1963) The use of lead citrate at high pH as an electron-opaque stain in electron microscopy. *J. Cell Biol.*, **17**, 208–212.
- Shpakovski G.V., Lebedenko E.N. (1997) Molecular cloning and characterization of cDNA of the *rpc10⁺* gene encoding the smallest subunit of nuclear RNA polymerases of *Schizosaccharomyces pombe*. *Russian Journal of Bioorganic Chemistry*, **23**, 441–448.
- Shpakovski G.V., Shematorova E.K. (1999) Rpc19 and Rpc40, two alpha-like subunits shared by nuclear RNA polymerases I and III, are interchangeable between the fission and budding yeasts. *Current Genetics*, **36**, 208–214.
- Shpakovski G.V., Spivak S.G., Mazanik S.N., Akhrem A.A. (1992) Study of cytochrome P450XIA1 genes structure and their expression in heterologous systems. Proceedings of the II

- (Second) All-Union Plan-Report Conference on the direction "Genetic and Cellular Engineering" (November-December 1991, Pushchino-on-Okla), 58-59.
- Simerský R., Novák O., Morris D.A., Pouzar V., Strnad M. (2009) Identification and quantification of several mammalian steroid hormones in plants by UPLC-MS/MS. *Journal of Plant Growth Regulation*, **28**, 125–136.
- Spivak S.G., Berdichevets I.N., Litvinovskaya R.P., Drach S.V., Kartel N.A., Shpakovski G.V. (2010) Some peculiarities of steroid metabolism in transgenic *Nicotiana tabacum* plants bearing the *CYP11A1* cDNA of cytochrome P450_{SCC} from the bovine adrenal cortex. *Russian Journal of Bioorganic Chemistry*, **36**, 224–232.
- Spivak S.G., Berdichevets I.N., Yarmolinsky D.G., Maneshina N.V., Shpakovski G.V., Kartel N.A. (2009) Construction and characteristics of transgenic tobacco *Nicotiana tabacum* L. plants expressing *CYP11A1* cDNA encoding cytochrome P450_{SCC}. *Russian Journal of Genetics*, **45**, 1067–1073.
- Ylstra B., Touraev A., Brinkmann A.O., Heberle-Bors E., Tunen A. (1995) Steroid hormones stimulate germination and tube growth of in vitro matured tobacco pollen. *Plant Physiology*, **107**, 639–643.
- Zhu Y.Y., Machleder E.M., Chenchik A., Li R., Siebert P.D. (2001) Reverse transcriptase template switching: a SMART approach for full-length cDNA library construction. *Biotechniques*, **30**, 892–897.